

مكان إعطاء الطعم	اسم الطعم ونوعه	سن الطفل عند التطعيم
الحقن بالعضل بالكثف	جرعة من توكسيد التيتانوس	الطفل في المرحلة الجنينية، ويعطى إلى الأم الحامل عند الشهر الخامس من الحمل الأول
الحقن بالعضل بالكثف	جرعة من توكسيد التيتانوس	الطفل في المرحلة الجنينية، ويعطى إلى الأم الحامل عند الشهر السابع من الحمل الأول
الحقن بالعضل بالكثف	جرعة من توكسيد التيتانوس عند كل حمل بعد الحمل الأول	الطفل في المرحلة الجنينية، ويعطى إلى الأم الحامل
الحقن في عضلة الفخذ الأمامية	جرعة أولى من مطعوم الالتهاب الكبدي ب	اليوم الأول من ولادة الطفل
الحقن في عضلة الفخذ الأمامية	جرعة واحدة من شلل الأطفال بالحقن (IPV)	عند نهاية الشهر الثاني من العمر
الحقن في عضلة الفخذ الأمامية	جرعة أولى من المطعوم الخماسي (يحتوي على الدفتريا والتيتانوس والسعال الديكي والهييموفيليس إنفلونزا والكبدي ب)	
الحقن في عضلة الفخذ الأمامية	جرعة أولى من مطعوم النيموكوكال مطعوم الالتهاب الرئوي	
نقط بالفم	الجرعة الأولى من مطعوم الروتا (تعطى جرعات الروتا حسب فئة المطعوم المستخدم جرعتين أو 3 جرعات)	
الحقن داخل الجلد أعلى الكتف في أعلى ويسار اليد اليسرى	تطعيم ضد الدرن (بي سي جي)	نهاية الشهر الثالث من العمر
الحقن في عضلة الفخذ الأمامية	الجرعة الثانية من مطعوم الشلل بالحقن (ثلاثي الفصيلة)	عند نهاية الشهر الرابع
نقط بالفم	جرعة أولى من شلل الأطفال الفموي (نمط 1،2،3)	
الحقن في عضلة الفخذ الأمامية	جرعة ثانية من المطعوم الخماسي	
الحقن في عضلة الفخذ الأمامية	جرعة ثانية من مطعوم النيموكوكال (التهاب الرئة)	
نقط بالفم	الجرعة الثانية من مطعوم الروتا	عند نهاية الشهر السادس
نقط بالفم	جرعة ثانية من شلل الأطفال الفموي (نمط 1،2،3)	
الحقن في عضلة الفخذ الأمامية	جرعة ثالثة من المطعوم الخماسي	

	جرعة ثالثة من مطعوم النيموكوكال (الالتهاب الرئوي)	الحقن في عضلة الفخذ الأمامية
	الجرعة الثالثة من مطعوم الروتا	نقط بالفم
عند نهاية العام الأول من العمر	الجرعة الأولى من مطعوم الحصبة/الحصبة الألمانية/النكاف	الحقن تحت الجلد بأعلى الذراع
	الجرعة الأولى من مطعوم الجدري	الحقن تحت الجلد بأعلى الذراع
	مطعوم السحايا المتقارن	الحقن في عضلة الفخذ الأمامية
	جرعة ثالثة من شلل الأطفال الفموي (نمط 1،2،3)	نقط بالفم
عند نهاية الشهر الثامن عشر	جرعة منشطة من شلل الأطفال (نمط 1،2،3)	نقط بالفم
	جرعة منشطة من المطعوم الخماسي	الحقن بالعضل
	جرعة منشطة من مطعوم النيموكوكال (التهاب رئوي)	الحقن في عضلة الفخذ الأمامية
عند نهاية العام الثاني من العمر	التهاب السحايا الميننجوكوك الرباعي	الحقن تحت الجلد في الذراع
	الجرعة الثانية من مطعوم الحصبة/الحصبة الألمانية/النكاف	الحقن تحت الجلد بأعلى الذراع
عند عمر الثلاث سنوات ونصف	جرعة منشطة من شلل الأطفال (نمط 1،2،3)	نقط بالفم
	جرعة من المطعوم الثلاثي (دفتريا/تيتانوس/سعال ديكوي)	الحقن بالعضل
من سن 4 سنوات إلى سن 6 سنوات	التأكد من الحالة التطعيمية للطفل وإعطاء التطعيمات غير المعطاة للطفل	
الصف السادس (من عمر 10 أعوام إلى عمر 12 عام)	جرعة منشطة الحصبة/الحصبة الألمانية/النكاف (إناث)	الحقن تحت الجلد
	مطعوم البكتيريا الثنائي الدفتريا والتيتانوس (إناث وذكور)	الحقن في العضلة الدالية في الذراع
الصف الرابع الثانوي (من عمر 16 أعوام إلى عمر 18 عام)	مطعوم البكتيريا الثنائي الدفتريا والتيتانوس	الحقن في العضلة الدالية في الذراع